

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent

Coagadex 250 IU trab u solvent għas-soluzzjoni għall-injezzjoni

Coagadex 500 IU trab u solvent għas-soluzzjoni għall-injezzjoni

fattur X tal-koagulazzjoni umana

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispizjar, jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhum Coagadex u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Coagadex
3. Kif għandek tuża Coagadex
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen Coagadex
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhum Coagadex u għalxiex jintuża

Coagadex hu konċentrat ta' fattur X tal-koagulazzjoni umana, proteina bżonnjuża għad-demem sabiex jagħqad. Il-fattur X f'Coagadex huwa estratt mill-plażma umana (il-parti likwida tad-demem). Dan jintuża sabiex jikkura u jipprevjeni l-fsada f'pazjenti b'defiċjenza ereditarja ta' fattur X inkluż waqt operazzjoni.

Il-pazjenti b'defiċjenza tal-fattur X ma għandhomx biżżejjed tal-fattur X sabiex id-demem tagħhom jagħqad sewwa, li jwassal għal fsada eċċessiva. Coagadex jissostitwixxi l-fattur X nieqes u jippermetti d-demem tagħhom sabiex jagħqad b'mod normali.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Coagadex

Tużax Coagadex:

- jekk inti allergiku għal fattur X tal-koagulazzjoni umana jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (elenkati fis-sezzjoni 6).

Iċċekkja mat-tabib tiegħek jekk taħseb li dan japplika għalik.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, l-ispizjar jew l-infermier tiegħek qabel tuża Coagadex:

- jekk inti għandek fsada akbar jew itwal mis-soltu u l-fsada ma tiqafx wara injezzjoni ta' Coagadex.
- jekk qed tiehu medicina li tipprevjeni d-demem milli jaqgħad billi timblokka l-fattur Xa li jagħqad id-demem. Dawn il-medicini jistgħu jipprevjenu lil Coagadex milli jaħdem.

Xi pazjenti b'nuqqas ta' fattur X jistgħu jiżviluppaw inibituri (antikorpi) għall-fattur X waqt il-kura. Dan jista' jfisser li l-kura mhux ser taħdem tajjeb. It-tabib tiegħek ser jiċċekkja regolarment għall-

izvilupp ta' dawn l-antikorpi, u speċjalment qabel operazzjoni. Kemm qabel kif ukoll wara l-kura b'din il-medicina, b'mod partikolari għall-ewwel kors ta' kura tiegħek, it-tabib tiegħek probabbilment se jwettaq testijiet sabiex jiċċekkja l-livell tal-fattur X fid-demm tiegħek.

Sigurtà mill-virus

Meta l-medicini jkunu magħmulin minn demm jew plażma umana, jittiehdu ċerti miżuri għall-prevenzjoni li jgħaddu infezzjonijiet lil min jirċevihom. Dawn jinkludu:

- l-għażla bir-reqqa ta' donaturi tad-demm u tal-plażma, biex ikun żgurat li daww li qegħdin f'riskju li jkollhom infezzjonijiet jiġu esklużi,
- l-ittestjar ta' plażma mogħti bħala donazzjoni għal sinjali ta' virus/infezzjonijiet,
- l-inklużjoni ta' passi fl-ipproċessar tad-demm jew tal-plażma, li jistgħu jiddiżattivaw jew ineħħu l-viruses.

Il-miżuri li jittiehdu huma kkunsidrati li huma effettivi għall-virusijiet li ġejjin: virus tal-immunodeficienza umana (HIV), il-virus tal-epatite B, il-virus tal-epatite Ċ, il-virus tal-epatite A, u l-parvovirus B19. Minkejja dawn il-miżuri, meta jingħataw medicini ppreparati minn demm jew plażma umana, il-possibbiltà li tgħaddi xi infezzjoni ma tistax tiġi eskluża għal kollox. Dan japplika wkoll għal kwalunkwe viruses mhux magħrufa jew ġodda, jew tipi oħrajn ta' infezzjonijiet.

Hu rrakkomandat bil-qawwa li kull darba li tirċievi doża ta' Coagadex, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott jiġi rreġistrati, sabiex jinżamm rekord tal-lottijiet li jintużaw.

It-tabib tiegħek jista' jirrakkomanda li tikkunsidra li jkollok tilqima kontra l-epatite A u B jekk regolarment jew b'mod ripetut tirċievi prodotti ta' fattur X miksuba minn plażma umana.

Tfal u adolexxenti

It-twissijiet u prekawzjonijiet elenkati għall-adulti japplikaw ukoll għat-tfal (2 sa 11-il sena) u adolexxenti (b'età minn 12 sa 18-il sena).

Medicini oħra u Coagadex

Għid lit-tabib jekk qiegħed tiegħu, haadt dan l-aħħar jew tista' tiegħu xi medicina oħra.

Tqala, treddigh u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispizjar tiegħek qabel tiegħu din il-medicina.

Sewqan u thaddim ta' magni

M'hemm l-ebda effetti magħrufa ta' din il-medicina fuq il-ħila biex issuq jew thaddem magni.

Coagadex fih is-sodium

Din il-medicina fiha sa 9.2 mg sodium (il-komponent prinċipali tal-melħ tat-tisjir/li jintuża mal-ikel) f'kull millilitru tas-soluzzjoni. Dan huwa ekwivalenti għal 0.0046% tal-ammont massimu rakkomandat ta' sodium li għandu jittiehed kuljum mad-dieta minn adult.

3. Kif għandek tuża Coagadex

Il-kura tiegħek għandha tinbeda minn tabib li għandu esperjenza fil-kura ta' disturbi ta' fsada.

Dejjem għandek tuża din il-medicina skont il-parir eżatt tat-tabib jew tal-ispizjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew l-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Coagadex għandu jiġi injettat direttament go' vina. Qabel ma tinjetta din il-medicina d-dar, inti suppost li tkun irċiejt taħriġ mill-professjonista tal-kura tas-saħħa tiegħek dwar kif tinjetta.

It-tabib tiegħek se jispjegalek kemm mediċina għandek tuża, meta għandek tużaha u għal kemm żmien. It-tabib tiegħek normalment se jgħidlek id-doża tiegħek f'termini tan-numru ta' kunjetti shaħ li jfornu d-doża l-aktar adattata għalik.

L-użu fl-adulti

Kemm jinghata Coagadex għall-kura ta' fsada jew għall-prevenzjoni ta' fsada addizzjonali?

It-tabib tiegħek se jgħidlek kemm għandek tagħti Coagadex biex tikkura fsada u biex tipprevjeni aktar fsada; id-doża mehtieġa se tiddependi fuq il-livell normali tiegħek fid-demm ta' fattur X.

Kemm tinghata mediċina qabel, waqt u wara operazzjoni maġġuri?

Qabel: Id-doża użata ta' Coagadex għandha tkun biżżejjed biex iżżid il-livell ta' fattur X fid-demm tiegħek għal bejn 70 u 90 unità/dL. Id-doża li għandek bżonn se tkun tiddependi fuq il-livell normali fid-demm tiegħek ta' fattur X, u dan se jiġi kkalkulat mit-tabib tiegħek.

Wara: Matul l-ewwel ftit jiem wara l-operazzjoni, il-konċentrazzjoni ta' fattur X fil-plażma tiegħek se jiġi ċċekkjat regolarment. Hu rakkomandat li l-livell ta' fattur X fid-demm tiegħek jinżamm aktar minn 50 unità/dL. Id-doża li għandek bżonn se tiġi kkalkulata mit-tabib tiegħek.

Jekk il-konċentrazzjoni ta' fattur X fid-demm tiegħek tkun baxxa wisq (din se tiġi ttestjata mit-tabib tiegħek), jew jekk tonqos aktar malajr milli mistenni, jista' jkun hemm inibitur ta' fattur X preżenti li jwaqqaf lil din il-mediċina milli taħdem kif suppost. It-tabib tiegħek se jirranġa għat-testijiet adattati tal-laboratorju biex tara jekk dan hux il-każ.

Kemm jinghata regolarment għall-prevenzjoni fit-tul tal-fsada?

It-tabib tiegħek ser jagħtik parir jekk dan l-użu huwiex adattat għalik u, jekk iva, dwar id-doża xierqa.

L-użu fi tfal u fl-adolesxenti

It-tabib tiegħek se jirrakomanda doża adattata għalik jew għat-tifel/tifla tiegħek. Id-doži għal tfal ta' inqas minn 12-il sena ġeneralment huma ikbar minn dawk użati fl-adolesxenti u l-adulti. Id-doži għall-adolesxenti jkunu simili għal dawk għall-adulti.

Meta tinjetta Coagadex

- Il-mediċina għandha tiġi injettata meta jsehh l-ewwel sinjal ta' fsada.
- L-injezzjoni għandha tiġi ripetuta skont il-bżonn biex twaqqaf il-fsada.
- Kull fsada individwali għandha tiġi ġġudikata fuq severità tagħha.
- Jekk qed tuża din il-mediċina għall-ewwel darba, it-tabib tiegħek se jissorveljak.

Kif tholl il-mediċini tiegħek qabel l-użu

Il-mediċina tiegħek trid tinhall **biss** fl-ilma sterilizzat ipprovdut mal-prodott.

Kwantità ta' Coagadex	Volum ta' solvent
250 IU	2.5 mL
500 IU	5 mL

Coagadex jiġi fornut bl-ammont ta' solvent kif muri fit-tabella.

Tista' tholl din il-mediċina billi tuża t-tagħmir tat-trasferiment tal-Mix2Vial mingħajr labra, li jkun inkluz f'kull pakkett.

Ħalli l-kontenituri ta' Coagadex jitiġħu għat-temperatura tal-kamra qabel ma thallathom. Aghmel il-mediċina kif ġej:



Pass 1

- Nehhi l-ghatu mill-kunjett tat-trab u naddaf il-parti ta' fuq tat-tapp bi swab bl-alkohol.
- Irrepeti dan il-pass bil-kunjett tas-solvent.
- Qaxxar lura l-parti ta' fuq tal-pakkett tat-tagħmir tat-trasferiment, iżda halli t-tagħmir fil-pakkett.



Pass 2

- Poġġi t-tarf blu tat-tagħmir tat-trasferiment fuq il-kunjett bis-solvent u mbotta dritt 'l isfel sakemm il-ponta tippenetra t-tapp tal-gomma u tikklikkja f'postha.
- Nehhi l-pakkett ta' barra tal-plastik mit-tagħmir tat-trasferiment u armih, u oqgħod attent li ma tmissx it-tarf espost tat-tagħmir.



Pass 3

- Dawwar il-kunjett bis-solvent rasu 'l isfel, bit-tagħmir li jkun għadu mwahħal.
- Poġġi t-tarf trasparenti tat-tagħmir tat-trasferiment fuq il-kunjett bit-trab u mbotta dritt 'l isfel sakemm il-ponta tippenetra t-tapp tal-gomma u tikklikkja f'postha.



Pass 4

- Is-solvent se jingibed fil-kunjett bit-trab mill-vacuum li jkun fih.
- Hawwad il-kunjett bil-mod biex tiżgura li t-trab ikun thallat tajjeb. Içcaqlaqx il-kunjett bis-saħħa.
- Għandha tinkiseb soluzzjoni bla kulur, ċara jew xi ffit mil-lewn il-perli, normalment f'madwar minuta (massimu ta' 5 minuti).



Pass 5

- Issepara l-kunjett vojta tas-solvent u l-parti l-blu tat-tagħmir tat-trasferiment mill-parti trasparenti billi thollha billi ddawwar lejn ix-xellug.
- Aqbad siringa vojta (mhux ipprovduta fil-pakkett ta' Coagadex) u iġbed l-arja go fiha billi tiġbed il-plaġer sakemm tikseb l-istess volum meħtieġ tal-ilma miżjud f'pass 4.
- Ikkonnettja s-siringa mal-parti trasparenti tat-tagħmir tat-trasferiment umbotta l-arja fis-siringa għal gol-kunjett.



Pass 6

- Immedjatament aqleb il-kunjett tas-soluzzjoni ta' taħt fuq, li se tingibed gos-siringa.
- Skonnettja s-siringa mimlija minn mat-tagħmir.
- Il-prodott issa jkun lest għall-użu. Segwi l-prattiki normali tas-sigurtà għall-ghoti. Aċċerta ruhek li tuża l-prodott fi żmien siegħa wara li jkun sar.

Tużax din il-mediċina:

- jekk is-solvent ma jingibidx għal ġol-kunjett (dan jindika telf ta' vacuum fil-kunjett, u għalhekk it-trab ma jridx jintuża).
- jekk it-trab mahlul u s-solvent jiffurmaw ġell jew embolu (jekk dan jigri, jekk jogħġbok għid lill-fornitur tal-kura tas-saħħa tiegħek, billi tirrapporta n-numru tal-lott stampat fuq il-kunjett).

Jekk tuża Coagadex aktar milli suppost

Jekk inti tuża aktar minn din il-mediċina milli qallek it-tabib, hemm il-possibilità li d-demm jagħqad. Jekk taħseb li tista' tkun qed tuża żżejjed, waqqaf il-injezzjoni u għid lit-tabib, spiżjar jew infermier. Jekk taf li tkun użajt iżżejjed, għid lit-tabib, l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek kemm jista' jkun malajr.

Jekk tinsa tuża Coagadex

M'għandekx tiehu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tiehu. Injetta d-doża normali tiegħek hekk kif tiftakar u mbagħad kompli d-dożaġg skont kif jgħidlek it-tabib tiegħek.

Jekk tieqaf tuża Coagadex

Dejjem ikkonsulta lit-tabib tiegħek qabel ma tiddeċiedi li twaqqaf il-kura tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Reazzjonijiet allergiċi (sensittività eċċessiva) rari seħħew fil-kura ta' disturbi ta' fsada b'mediċini simili (jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1,000), u xi kultant javvanzaw għal xokk. Sinjali ta' dawn jistgħu jinkludu raxx tal-ġilda (inkluz horriqija), tingiż, fwawar, dardir, rimettar, uġiġh ta' ras, sogħla, tharhir, tagħfis fis-sider, tertir, rata tal-qalb mġaġġla, sturdament, telqa, irrikwitezza, nefha fil-wieċ, tagħfis fil-gerżuma, uġiġh fil-post tal-injezzjoni.

Jekk ikollok kwalunkwe wiehed minn dawn, ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

L-effetti sekondarji li ġejjin ġew irrapportati b'Coagadex.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10):

- uġiġh jew ħmura fil-post tal-injezzjoni
- ghejja
- uġiġh fid-dahar

Effetti sekondarji fit-tfal u l-adolesxenti

L-effetti sekondarji fit-tfal huma mistennija li jkunu l-istess bħall-adulti.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar, jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz ADR Reporting Website: <https://medicinesauthority.gov.mt/adrportal>.

Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħzen Coagadex

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kontenituri wara "JIS". Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.

Tagħmlux fil-friza.

Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota frak żgħir fil-prodott mahlul. Ġaladarba jsir, Coagadex għandu jintuża fi żmien siegħa.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Iċ-ċentru tal-kura tiegħek se jipprovdni kontenitur speċjali biex fih tarmi kwalunkwe soluzzjoni li tibqa', kwalunkwe siringi, labar u kontenituri vojta użati. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

X'fih Coagadex

- Is-sustanza attiva hi fattur X tal-koagulazzjoni umana. Kunjett wiehed fih nominalment 250 IU jew 500 IU tal-fattur X tal-koagulazzjoni umana.
- Is-sustanzi l-oħra huma: citric acid, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, sodium hydroxide u sucrose (ara sezzjoni 2 għal aktar informazzjoni dwar l-ingredjenti).
- Solvent: ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Coagadex u l-kontenut tal-pakkett

Coagadex hu trab abjad jew abjad jagħti fil-griż, u hu ppakkjat fi kwantitajiet ta' 250 IU u 500 IU. Wara li ssir, is-soluzzjoni hija bla kulur, ċara jew xi ftit lewn il-perli (opalexxenti). Qabel l-injezzjoni, haress lejn is-soluzzjoni. Jekk is-soluzzjoni tkun imtappna jew għandha xi trab, tużahix.

Tagħmir tat-trasferiment imsejjaħ Mix2Vial jiġi pprovdut ukoll.

Kontenut tal-pakkett ta' 250 IU

1 kunjett ta' 250 IU ta' trab
1 kunjett ta' 2.5 mL ta' ilma għall-injezzjonijiet
1 tagħmir ta' Trasferiment (Mix2Vial)

Kontenut tal-pakkett ta' 500 IU

1 kunjett ta' 500 IU ta' trab
1 kunjett ta' 5 mL ta' ilma għall-injezzjonijiet
1 Tagħmir ta' Trasferiment (Mix2Vial)

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Dornhofstraße 34, 63263 Neu-Isenburg
Il-Ġermanja

Manifattur

PharmaKorell GmbH, Georges-Köhler-Str. 2, 79539 Lörrach, Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tél/Tel: + 44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Royaume-Uni/Verenigd
Koninkrijk/Großbritannien)

България

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Тел.: + 44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Обединено кралство)

Česká republika

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Velká Británie)

Danmark

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tlf: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Storbritannien)

Deutschland

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +49 (0) 2408 146 0245
e-mail: bpl@medwiss-extern.de
Deutschland

Eesti

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Ühendkuningriik)

Ελλάδα

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Τηλ: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Ηνωμένο Βασίλειο)

España

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Reino Unido)

France

Laboratoire Cevibra
Tel: +33 493705831
e-mail: contact@cevidra.com
France

Lietuva

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Jungtinė Karalystė)

Luxembourg/Luxemburg

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tél/Tel: + 44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Royaume-Uni/Verenigd
Koninkrijk/Großbritannien)

Magyarország

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Egyesült Királyság)

Malta

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Ir Renju Unit)

Nederland

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Verenigd Koninkrijk)

Norge

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tlf: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Storbritannia)

Österreich

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Großbritannien)

Polska

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Wielka Brytania)

Portugal

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Reino Unido)

Hrvatska

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Ujedinjeno Kraljevstvo)

Ireland

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(United Kingdom)

Ísland

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Sími: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Bretland)

Italia

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Regno Unito)

Κύπρος

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Τηλ: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Ηνωμένο Βασίλειο)

Latvija

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Lielbritānija)

România

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Marea Britanie)

Slovenija

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Združeno kraljestvo)

Slovenská republika

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Spojené kráľovstvo)

Suomi/Finland

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Puh/Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Iso-Britannia)

Sverige

BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Tel: +44 (0) 20 8957 2255
e-mail: medinfo@bpl.co.uk
(Storbritannien)

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f' 06/2025.

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>